

Traumatisme dentaire suite à une chute ou un coup sur les dents

dent temporaire

dent permanente

dent cassée



rouge ou rose visible dans la dent


urgence
voir un dentiste dans la journée

PAS de rouge ou rose visible dans la dent

douloureux

pas douloureux
voir un dentiste dans 1 jour ou 2

dent mobile (ou déplacée)




empêche de fermer la bouche

urgence
voir un dentiste dans la journée

n'empêche pas de fermer la bouche

voir un dentiste dans 1 jour ou 2

dent expulsée




! On ne replace pas de dent temporaire !

voir un dentiste dans 1 jour ou 2 (il vérifiera les dents voisines et la dent permanente en dessous)

dent fêlée



dent impactée



voir un dentiste dans 1 jour ou 2

dent cassée



Morceau retrouvé ?
Le conserver dans du lait ou de la salive.


urgence
voir un dentiste dans la journée

dent mobile (ou déplacée)



urgence
voir un dentiste dans la journée

dent expulsée



1. Retrouver la dent.
2. La tenir par la couronne.
3. Si la dent est souillée (gravillons ou saletés), la rincer délicatement au sérum physiologique.
4. 3 possibilités :
 - repositionner la dent à sa place si possible
 - la conserver dans du lait, de la salive ou du sérum physiologique
 - dans la bouche de l'enfant entre joue et molaires.
5. **URGENCE** au plus vite dans la journée. Chaque minute est précieuse !

dent fêlée

